

University of Groningen

## Over de roentgendiagnostiek van de lumbale hernia nucleï pulposi

Ubbens, Rengnier

**IMPORTANT NOTE:** You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1960

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Ubbens, R. (1960). *Over de roentgendiagnostiek van de lumbale hernia nucleï pulposi*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [s.n.].

### Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

### Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

## STELLINGEN

### I

Lumbale myelografie dient uitgevoerd te worden met een in water oplosbaar contrastmiddel.

### II

De opvatting, dat lunatummalacie het gevolg is van een fractuur, kan röntgenologisch slechts zelden aannemelijk worden gemaakt.

### III

Bij de ophthalmodynamometrie is de bepaling van de systolische waarden van essentieel belang.

Docum. Ophthal. 13, 1959.

### IV

Het is onjuist, dat er in de röntgenologische literatuur nog gesproken wordt van de ziekte van Kümmell.

### V

Cytologisch onderzoek van vaginale uitstrijkpreparaten is van waarde bij de bepaling van de prognose van het cervixcarcinoom.

Cancer, 13, 1960, 15—19.

### VI

De voordelen van het onderzoek met harde röntgenstralen worden overschat.

### VII

Klinisch en biptisch onderzoek van de testis is van grote waarde voor de diagnostiek van periarteriitis nodosa.

## VIII

Beenafwijkingen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van ouderdomsdoofheid.

Acta Oto-laryngologica. Suppl. 143, 1958.

## IX

Bij de plaatsbepaling van afwijkingen in de thorax wordt onvoldoende aandacht geschonken aan het „silhouet-symptoom”.

## X

De redactie van art. 1 van de ongevallenwet laat toe, dat uitsluitend stoffelijke schade aan de verzekerde wordt vergoed.

STELLINGEN BEHORENDE BIJ  
R. UBBENS, OVER DE RÖNTGENDIAGNOSTIEK VAN DE  
LUMBALE HERNIA NUCLEI PULPOSI  
GRONINGEN 1960